

یک فوق تخصص بیماریهای عفونی:

مصرف سوسیس و کالباس خام در زنان باردار باعث سقط جنین می‌شود

۱۳۹۰/۱۱/۲۳ - ۱۰:۴۴ - کد خبر: ۴۲۴۲۳

سلامت نیوز : یک فوق تخصص بیماریهای عفونی گفت: زنان باردار به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری "توکسوپلاسموزیس" از مصرف سوسیس و کالباس خوب پخته نشده و نیز تماس با گربه خودداری کنند چرا که ابتلا به این بیماری منجر به سقط جنین می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ، دکتر مسعود مردانی ، افزود: افراد نباید سوسیس و کالباس مصرف کنند اما اگر مجبور به انجام این کار شدند باید این دو ماده را به خوبی در روغن سرخ کنند یا آن‌ها را تفت دهند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه احتمال ابتلا به توکسوپلاسموزیس بر اثر مصرف پیتزا نیز وجود دارد، تصریح کرد: متأسفانه سوسیس و کالباس ازگوشت‌های نامرغوب تهیه می‌شوند و هنگام تهیه پیتزا به اندازه کافی حرارت داده نمی‌شود. بنابراین عامل کیست توکسوپلاسموزیس در آن‌ها از بین نمی‌رود.

وی در ادامه گفت: برخی از افراد به علت تماس با گربه، چنگ زدن این حیوان و حتی تمیز کردن مدفوع آن به بیماری توکسوپلاسموزیس مبتلا می‌شوند. این بیماری به علت افزایش نگهداری از گربه در شهرهای بزرگ ایران شیوع بیشتری پیدا کرده است. علاوه بر آن افرادی که فراورده‌های گوشتی خوب پخته و کباب نشده را مصرف می‌کنند نیز ممکن است به این بیماری دچار شوند.

مردانی درباره علائم ابتلا به توکسوپلاسموزیس اظهار کرد: این بیماری هیچگونه علامتی ندارد ولی در برخی از موارد با بزرگی کبد و طحال و بزرگی غدد لنفاوی ناحیه گردن همراه است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه تب مالت، یکی از بیماری‌های شایع مشترک بین انسان و دام است، گفت: موارد متعددی از ابتلا به این بیماری در نقاط مختلف ایران گزارش شده است. حیوان ابتدا به این بیماری دچار می‌شود و انسان به تبع استفاده از فراورده‌های دامی مانند شیر، پنیر و حتی گوشت گاو و گوسفند به آن مبتلا می‌شود.

این فوق تخصص بیماری‌های عفونی اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، ۲۵ درصد هزار نفر از ایرانیان به این بیماری مبتلا هستند ولی به نظر می‌رسد آمار واقعی از این میزان بیشتر باشد.

وی بیماری‌های را یکی دیگر از بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوانات برشمرد و اظهار کرد: انسان بر اثر تماس با سگ‌ها به ویژه گازگرفتگی دچار این بیماری می‌شود و بر اثر ابتلا به آن صد در صد فوت می‌کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به میزان شیوع این بیماری در ایران اظهار کرد: هاری در نقاط مختلف کشور حتی تهران وجود دارد و به ویژه در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان دیده می‌شود چرا که مناطق جنگلی در این استان‌ها زیاد است و ممکن است کشاورزان، دامداران و حتی مسافران در این مناطق گرفتار سگ‌های هار شوند.

مردانی در پایان به صاحبان سگ‌های خانگی توصیه کرد که اقدام به واکسیناسیون این حیوانات نکنند.

مطالب مرتبط

- راهنمای صدور مجوز سقط درمانی و مصادیق آن ابلاغ شد
 - هشدار درباره سقط جنین‌های غیرقانونی
 - اعلام ممنوعیت خدمات جراحی پیشگیری از بارداری یا مشروعیت سقط؟
 - پیامدهای ایجاد محدودیت در روش‌های جلوگیری از بارداری
 - ناهنجاری‌های کروموزومی علت نیمی از سقط‌های شناخته شده
 - سقط جنین، واژکتومی و تبلیغ برای فرزند کمتر مجازات دارد/ نظر موافقان و مخالفان
-